


Cartes de Gestion à domicile des cas de maladies des enfants de 2 mois à 5 ans






MINISTRE DE LA SANTE

RECHERCHER LES SIGNES DE DANGER



Même UN SEUL signe de danger suffit pour référer l'enfant



Etat nutritionnelle - Comment prendre le PB



Preparation de SRO ou ESS




Préparation du SRO ou l'eau-salée-sucrée


- ✓ Bouillir d'eau et le laisser refroidir
- ✓ Se laver les mains à l'eau et au savon;
- ✓ Préparer un litre d'eau propre et une tasse propre;
- ✓ Verser l'eau dans la tasse;
- ✓ Verser le contenu du sachet SRO (ou 2 pincée de sel et 8 carreaux de sucre/cuillère à café si le SRO n'est pas disponible) dans l'eau et bien mélanger;
- ✓ Donner par louche ou par bol à votre enfant;
- ✓ Donner assez du SRO après chaque selle liquide (1/2 louche moyenne pour l'enfant moins d'un an, 1 louche moyenne pour l'enfant de 1 à 2 ans et 2 louches moyennes pour 2 ans et plus);
- ✓ Bien couvrir la tasse et la vider après 24 heures même si l'enfant n'a pas tout bu et préparer à nouveau.



NB : Il faut bien protéger les ustensiles de préparation en les couvrant avec un tissu propre.



COMMENT UTILISER LES TESTS DE DIAGNOSTIC RAPIDE DU PALUDISME












Test positif



Test négatif







Test invalide :





Test invalide :



Evaluation de la Fièvre





Evaluation de la Diarrhee








































Evaluation de toux et respirations rapides
























Traitement

Zinc, 20 mg comprimé

		
		
Jour 1 		
Jour 2 		
Jour 3 		
Jour 4 		
Jour 5 		
Jour 6 		
Jour 7 		
Jour 8 		
Jour 9 		
Jour 10 		

Paracétamol, 100 mg

								
Jour 1 								
Jour 2 								

Paracétamol, 500 mg

















Jour 1



































Jour 2




l'Artesunate- Amodiaquine

		
		
<p>Jour 1</p> 		
<p>Jour 2</p> 		
<p>Jour 3</p> 		

COTRIMOXAZOLE 400 mg sulfaméthoxazole + 80 mg triméthoprim

				
				
<p>Jour 1 </p>				
<p>Jour 2 </p>				
<p>Jour 3 </p>				
<p>Jour 4 </p>				
<p>Jour 5 </p>				

Miel et citron



Jour 1



Jour 2







