

REHYDRATER L'ENFANT AVEC LES SELS DE REHYDRATATION ORAL (SRO) EN CAS DE DIARRHÉE



GRATUIT

Trouver les sachets de SRO dans tous les centres de santé. Si votre enfant a la diarrhée, il a besoin de beaucoup plus de liquides que d'habitude, comme le SRO pour compenser les liquides perdus, afin qu'il ne se fatigue pas ou ne meure pas de déshydratation.



FACILE

Se laver les mains au savon, verser tout le contenu d'un sachet dans un récipient propre et mélanger avec un (1) litre d'eau propre, bien mélangé pour dissoudre la poudre. Goûter la solution afin d'inciter l'enfant à prendre.



EFFICACE

Encourager l'enfant à en boire le plus possible pour éviter la déshydratation tout en continuant à allaiter et à alimenter l'enfant.

Jusqu'à 2 ans : donner 1/2 à 1 louche de SRO après chaque selle liquide.

2 ans et plus : donner 1 à 2 louches de SRO après chaque selle liquide.

Conception, Mise en page : UNICEF Niger • Photographie : UNICEF Niger / Giacomo Prozzi



PRATIQUES FAMILIALES ESSENTIELLES
LES GESTES QUI SAUVENT NOS ENFANTS

